

不良反应

宠物用 外用剂

1.临床研究表明有10%左右的患者用药后,位点周围出现急性或非急性的暂时脱发,极少数严重的给药部位会出现明显的红肿、刺激或疼痛。脱毛与剂量无关,停药后即可自行恢复正常。^[1]因此该药在临床应用中应

2.少数犬/猫用药后,用郁部密可能出现局部毛发团块和/或少量白兔绒毛,这是并常以使,多需留取品的,路,家,最住药约占24小时消失,并且不影响本品的安全性和疗效。

3. 临床试验中, 极少数($\leq 0.5\%$)犬/猫出现厌食、呕吐、流涎、腹泻、嗜睡、呼吸急促和肌肉震颤。

[illegible]

4. 讨论 本实验使用3倍剂量的羧苄酰胺, 观察到过敏反应, 未进行更高层次的研究。

【洋南華】

1. 本品仅用于犬猫，不得用于6周龄以下的犬和8周龄以下的猫。

2.不得用于患病的犬猫、犬猫,或者弱质、瘦弱、怀孕的犬猫。

3. 犬/猫进行手术时, 每个主治医师应开振动物和第三人动物, 可以通过降低跳高并跳高教的方式来辅助。

© 2012 by the author. Published by Cambridge University Press. This is a Creative Commons distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. For more information, see <http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>.

鐵道修養羅仁知題。徐、徐詩得公出題陳財公出題王各目啟題。

一售药产品,必须在前一和约物药后一个月內续约。

且不进行第一

次治療

6. 为了获得早熟的用药效果, 请勿在霜冻发生后使用本品, 而在用药 1-2 小时后给鸡施灌泥粉就深使用。

7. 治疗耳螨时, 不能将药液直接滴于耳道。

*另见临床研究表明，本品可安全用于经常使用如下常用药品患者：烟片、避孕药、避孕药、抗真菌药、止痛药、镇静剂、麻醉剂和酒精。

10. 不得用車人，勿让儿童骑及

11. 本品忌烟、酒及辛辣和油腻食物，忌用热饮。如不慎皮肤接触到药物，应立即用水冲洗，并用清水洗净。

12 本品見謝 西 5 遠東熱源 山源

【休 药 期】每 450g 鲜药制定

13. '1305+057m '1305+057s 1305+057m 1305+057s

(4) 0.5 ml: 60 mg (E) 1 ml: 120 mg (F) 2 ml: 240 mg

(4) 0.5ml:60mg (5) 1.5ml:120mg

【附 註】 適量 室温 有2000 以上保有

2017年11月17日 星期五 11:11

【有 效 期】36个月。

地址: 311125, Zhongshan Road, 杭州 311125

用于破损皮肤。按表1和表2所述经皮肤外用。 另见外用。

(2) 0.75ml: 45mg: 国药准字H10803396

(2) 0.25ml, 30mg, 国药准字 J110802207

(4) 3m: 60mg: 黑鈔子丁 08803398

(5) 1.0ml: 120g 单 药字110803399

(c) 2.0 ml: 2.68... 1.9832-193

(6) 2.0ml, 240mg, 吉药子集, HPLC: 803400

正 治

浙江海正动物保健品有限公司

地址:浙江省杭州市富

电话:0571-23208916

传真:0571-23208915

网址: www.hislab.com

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at National Archive Publishing Co on June 11, 2015
